

Кропмакс (Cropmax) - натуральний листовий біостимулятор-добриво для активації ростових процесів та живлення всіх видів плодовоовочевих та декоративних рослин.

Використовується як для позакореневого листового підживлення так і для обробки насіння.

Кропмакс, винайдений, запатентований у Нідерландах, на сьогодні є найкращим в класі біостимуляторів за рахунок багатосторонньої активної дії на ріст та розвиток рослин, яку забезпечує унікальна рецептура – **єдиний препарат, що містить в своєму складі в ультраконцентрованому вигляді всі життєві компоненти у природному фізіологічному балансі:**



Стимулятори та активатори ростових процесів:
Ауксини, Цитокиніни, Гіббереліни, Абсцизову кислоту, Етилен.



Амінокислоти: 17 видів, більшість з яких незамінні.



Повний комплекс елементів живлення:
Азот (N), Фосфор (P), Калій (K), Залізо (Fe), Магній (Mg), Цинк (Zn), Мідь (Cu), Марганець (Mn), а також B, Ca, Mo, Co, Ni.



Вітаміни, Ензими, Полісахариди.

Призначення Кропмаксу:

Поповнити нестачу чи відсутність власних регуляторів росту в рослині (що виникає в результаті погодних та інших стресів) та надати їй комплекс біостимуляторів, щоб активувати та стимулювати ростові процеси.

Усунути дефіцит елементів живлення, який трапляється в результаті зниження чи втрати здібності рослини в стресових умовах засвоювати їх з ґрунту.

Додатково підтримати енергію росту рослини полісахаридами та мультівітамінами.

Нормалізувати в рослині фізіологічні процеси для найкращого розкриття її біологічного потенціалу.

Фізіологічно-збалансована рецептура Кропмаксу забезпечує:

збільшення врожаю на 15-25%

значне підвищення імунітету до хвороб та стійкості до шкідників

покращення проростання насіння - схожості та енергії

підвищення засвоєння добрив, що дає можливість зменшити норму їх використання на 20-30%

покращення якості плодів: збільшення розміру, товарного вигляду, смакових характеристик

посилення гілкування, росту пагонів, цвітіння, зав'язі, плодоношення

активне відновлення рослин після пошкоджень градом, приморозками, при пересаджуванні та після аерації газонів

швидкий розвиток та об'ємне розгалуження кореневої системи - підвищення стійкості рослин до посухи та інших стресів

швидкий візуальний ефект в результаті навіть однократного застосування.

Кропмакс широко відомий в світі – експортується та застосовується в **47 країнах.**

Кропмакс належить до екологічних продуктів, оскільки виробляється з рослинної сировини таких культур як соя, рис та цукрова тростина. Має посвідчення від Інспекції з сертифікації «BCS Öko-Garantie» GmbH на застосування в **органічному сільському господарстві.**



Завдяки високій концентрації, Кропмакс застосовується в малих нормах

Зверніть увагу!

Переважає більшість обробок рослин проти шкідників та хвороб співпадає з рекомендованими фазами та термінами застосування **Кропмаксу**. Тому просто додавайте **Кропмакс** в обприскувач разом із засобами захисту.

Рекомендації з застосування Кропмаксу:

Культури та спосіб обробки	Норма Кропмаксу	Кількість води	Площа обробки
Обробка (замочування) насіння культур, бульб, цибулин перед посівом чи висадкою	3 мл	1 л	
Обробка розсади овочів чи квітів (висотою 5-7 см)	2,5 мл	10 л	50 м²
Обробка овочів в теплицях та парниках	15-20 мл	10 л	1 сотка
Овочі та квіти у відкритому ґрунті	10-15 мл	10 л	1-2 сотки
Виноград, ягідні кущі, фруктові дерева	10-15 мл	10 л	
Декоративні рослини (кущі, дерева, хвойні тощо)	10-15 мл	10 л	
Газони	10-15 мл	10 л	1-2 сотки

Кропмакс не слід змішувати з препаратами, що містять мінеральні олії, мідь та сірку, оскільки це може викликати фітотоксичність та зниження ефективності біостимулятора.

З іншими пестицидами та добривами можна застосовувати **Кропмакс** у бакових сумішах.

Для ефективно дії не застосовувати **Кропмакс** при високих (вище 25°C) та низьких (менше 5°C) температурах.

Перед застосуванням флакон обов'язково струсити.

Зберігати при температурі не нижче 0°C

Тарна упаковка: 50 мл, 100 мл, 1 л

Державна реєстрація препарату в Україні:
номер в реєстрі 14871, серія А 09490



Постачальник **Кропмаксу** в Україні
ТОВ «Садіба Центр»

Щоб в хаті та коло хати

Виробник: ТОВ «Садіба Центр»,
03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 150 А, офіс 101
Тел.: +38 (044) 222 88 01 • E-mail: info@sadyba.com • www.sadyba.com

Більше про Кропмакс



Кропмакс

НАТУРАЛЬНИЙ ЛИСТОВИЙ БІОСТИМУЛЯТОР-ДОБРИВО З АМІНОКИСЛОТАМИ ТА МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ



hollandfarming

Виробник: Холанд Фармінг Б.В./HOLLAND FARMING B.V.
Нідерланди, Groenekanseweg 246-L, 3737 AL Groenekan tel/fax +31 356017391

Технологічні схеми застосування на основних культурах

На томатах, перші, оскільки:

- Передпосівна обробка насіння: 3 мл/1 л води
- 4-5 справжніх листочки: 10-15 мл/10 л води
- Бутонізація: 10-15 мл/10 л води

На огірках:

- Передпосівна обробка насіння: 3 мл/1 л води
- Бутонізація: 10-15 мл/10 л води
- Цвітіння: 10-15 мл/10 л води
- Друга хвиля плодоношення: 10-15 мл/10 л води

На капусті:

- Передпосівна обробка насіння: 3 мл/1 л води
- 4-6 листків: 10-15 мл/10 л води
- Формування головки: 10-15 мл/10 л води

На моркві:

- Передпосівна обробка насіння: 3 мл/1 л води
- Формування коренеплоду: 10-15 мл/10 л води
- Інтенсивний ріст коренеплоду: 10-15 мл/10 л води

На буряку:

- Передпосівна обробка насіння: 3 мл/1 л води
- 4-6 справжніх листків: 10-15 мл/10 л води
- Змикання рядків: 10-15 мл/10 л води

На цибулі:

- Передпосівна обробка насіння: 3 мл/1 л води
- 4-6 листків: 10-15 мл/10 л води
- Інтенсивний ріст вегетативної маси: 10-15 мл/10 л води

На плодівих деревах:

- Рожевий бутон: 10-15 мл/10 л води
- Обладнання пелюсток: 10-15 мл/10 л води
- Розмір плоду з волоський горіх: 10-15 мл/10 л води

На винограднику:

- Довжина пагонів 15-20 см: 10-15 мл/10 л води
- Перед цвітінням: 10-15 мл/10 л води
- Ріст ягід: 10-15 мл/10 л води

На суніці:

- Відновлення вегетації: 10-15 мл/10 л води
- Початок цвітіння: 10-15 мл/10 л води

На картоплі:

- Передпосівна обробка бульб: 3 мл/1 л води
- Стеблування: 10-15 мл/10 л води
- Бутонізація: 10-15 мл/10 л води

На декоративних культурах



Особливо вдячно відгукуються на обробки **Кропмаксом** різноманітні декоративні культури: широколистяні та хвойні дерева і кущі, троянди, багаторічні та однорічні квіти.

Увага! Застосування **Кропмаксу** значно підвищує приживлюваність рослин при пересаджуванні, висадці, відновлення після стресових ситуацій (спека, посуха, приморозки, град, пригнічення пестицидами, механічні ушкодження та інші). Тому, в зазначених випадках проводять позачергову обробку **Кропмаксом** як реанімаційний захід для постраждалих рослин.

На газонах



Неперевершений наочний ефект на газонах - в Європі застосування **Кропмаксу** є стандартним елементом технології.

Для перезимуваних газонів - перша обробка для швидкого відновлення декоративного вигляду після проведення аерації та скарифікації весною, наступні з інтервалом 1-1,5 місяців.
Після посіву - перша обробка по сходою 5-7 см.
Після укладання газонних рулонів - перша обробка.